

bau und ihre Bekämpfung. 2. neubearbeitete Auflage. Berlin. — MASSEE, A. M. 1954. The pests of fruits and hops. London. 3rd edition. — NORDMAN, A. 1942. Till kännedomen om fjärilfaunan i ett landområde i det centrala skärgårdshavet i SW-Finland (Föglö—Bänö). Mem. Soc. Fl. & Fauna Fennica 18: 127—184. — 1936. Mötesmeddelande. Notulae Entom. 16: 123. — SAALAS, U. 1933. Viljelyskasvien tuho- ja hyötyeläimet sekä muut selkärangattomat eläimet. — SAHLBERG, J. 1906. *Simaethis pariana* Hb., en för äppleträden skadlig, hos oss förut föga bemärkt småfjäril. Meddel. Soc. Fl. & Fauna Fennica 32: 18—19. SPULER, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas. 2. Band. Stuttgart. — TULLGREN, A. 1929. Kulturväxterna och djurvärlden.

**Apidologiska meddelanden.** — *Prosopis pictipes* Nyl. anmäldes nyligen (VALKEILA, Ann. Ent. Fenn. 22, p. 129—130) som ny för landet. Fyndet, en hona hade gjorts 29.6.1954 av dr E. Thuneberg i G e t a socken (Al). I en Mus. Fenn. tillhörig kollektion upptäckte undertecknad nyligen ett andra honexemplar, taget i grannsocknen H a m m a r l a n d på Äppelö av hemmansägaren E. Ölund. Liten som den är har arten tidigare tydligt blivit förbisedd.

*Andrena lathyri* Alf. NIEMELÄ (Ann. Ent. Fenn. 15, p. 105—106) betraktade arten som en stor sällsynthet. 1936 tog han på R u n s a l a ett större antal exemplar, men för övrigt voro endast några få fynd i Åbo-trakten gjorda. Omkring år 1950 hittade T. Kontuniemi några individ i F i n b y, nära undertecknads sommarbostad. Sporråd härav beslöt jag hålla ögonen öppna och fann mycket riktigt de fyra sista dagarna av maj 1955 32 ♀♀ och 72 ♂♂ samt 1957 i medlet av juni 28 ♀♀, alla på *Lathyrus vernus*. Djuren visade sig så fort någon enda blomma spruckit ut.

*Halictoides inermis* Nyl. Denna art har varit känd från Finland i ett enda ♂-exemplar, taget kanske för redan 100 år sedan av F. W. Mäklin (1821—1883) i T a i p a l s a a r i (Sa). Den hos oss hart när legendariska arten återfann undertecknad år 1953 i S t. M i c h e l (Sa) invid järnvägen strax söder om själva staden. Den stora sandgropen där jämte angränsande marker är en synnerligen givande hymenopterlokal. 18.7.1953 tog jag 1 ♂, 19.7.1953 2 ♀♀, 14.7.1956 2 ♂♂, 20.7.1957 3 ♂♂ och 21.7.1957 1 ♂. Mål för blombesöken voro *Campanula glomerata* och *C. rotundifolia*.

*Dufourea vulgaris* Schck togs första gången i landet år 1921 i R a u t u (Ik) av R. Forsius i stor myckenhet på blommorna av *Leontodon autumnalis*. På 1930-talet togs talrika exemplar av arten i samma socken av P. Niemelä. Senaste vinter hade jag till bestämning en mindre kollektion bin tagna av forstmästare M. Pohjola. Bland dem fanns, högst oväntat, en hona av arten från K e u r u u (Tb).

*Bombus soroënsis* F. Av denna särskiljas två underarter: *soroënsis* F. med vitthårig och *proteus* Gerst. med röd- eller svarthårig bakkroppsspets. Tidigare har ansetts att endast den förstnämnda underarten finnes i Finland. Nyligen upptäckte jag dock, att bland det obestämda materialet på Mus. Fenn. hamnat en *Bombus*-hane, som prof. KRUSEMAN redan 1952 bestämt till *ssp. proteus*. På determinationslappen står antecknat »Sehr merkwürdige Fundstelle». Djuret är ett redan gammalt fynd, etiketterat H e l s i n k i, Vesterlund.

R a b b e E l f v i n g