



Sphex pubescens (Lurt.) Janakkala



Kotelo-
kopassa iso
ulko-kuori,
kartiomainen pära, jona ulosteet ja lujat, soikea koppa, jonka sisäpinta hiirtävä, "semmättu".

Nahka hieman mystermäinen
ylähuulella vahvat kylomyt.

Kotelo-
kopassa iso
ulko-kuori,
kartiomainen pära, jona ulosteet ja lujat, soikea koppa, jonka sisäpinta hiirtävä, "semmättu".

Sphex pubescens (Curt.). Janakkala

Kotelo: Otsan molemmilla riveillä runsaasti pieniä okia, jotka päättyvät keskiviivan kohdalta n. $\frac{1}{4}$ otsan leveydestä käännettävältä alalta. Päälaelle nämä okarykymät ulottuvat vain verkkorivien rivisivuille, jossa ne päättyvät läheltä miesten takahulmaa. Muuten on päätöksiä sileä. Tuontsarivien ulkopuolella runsaasti pieniä okia. Keskisellä muuten sileä, mutta sen keskellä kaksi isoa, joihin matalaa kyhmyä, joitten pyörästynyt, litistynyt käähi suunnautuu sivulle, ikäänkuin ne olin painetta litteiksi. Kaikissa säärissä ja nilkoissa on runsaasti pieniä okia, jotka etu- ja keskisäärissä kuitenkin ovat isompia kuin muualla; lisäksi etunilkoissa rivoilla (eli vain keskiviivasta pois päin) on kaivinnuksia vastaavia pitempiä okia, jotka tyvi- ja oskessa ovat pitkiä, tyvi- ja oskessa on näitä pitkiä okia myös toisen rivi rivä-rivulla (eli vain keskiviivaa kohti suunnautuneina).

Takaruumiin 7. selkäkilpi on lyhyt, mutta 1. vatrakilpi niin pitkä, että se ulottuu 3. vatrakilven puoliväliin ja ylittää siis pitkän kielimäisen lisäkkeen tapaisena 2. vatrakilven. Tämä herättää vaikutelman, että takaruumiin tyvi on taivuttanut linkkareiden ta-paan kokeen. Vain tällä tavoin sulitehisen lyhyen kotelohaps-paan mahtuu sitä huomattavasti pitemmän hyönteisen kotelo.

Selkäkilpien 2.-5. rivoilla isot, pyöreistä kyhmyistä lähtevät,

kätkeen jään riippenevat ja taaksejään koukistuneet tapit
(Samanlaiset kuin Crabronidae -alajheimolla ja Trypanoxylon-muulla);
1.-5. selkähilpien takaruumana rivi pieniä okia.