


21/-60 *Oxybelus uniglamus* Hämeenlinna, sorakuopan törmästä.

Jälkitoukka talvehtiessaan niin häyritynyt, että <sup>pää</sup>melkein hahvonaan juidonaa (kuten esim. *Rhyacion* *tibiale* ♂)

Pää rakenteeltaan samanlainen kuin *Coelocrabo*-lajiilla (es. *cincius*), vain hiujin vähäisiä eroja, tuskin lajitunnusmerkkejä

Kotel muistuttaa paljon esim. *Coelocrabo cincius*-koteloa; pirsteritnä hylmyt pienet, taemmät ovat etummaista korkeammat; keskiselässä ei ole hylmyjä; kaikkina päässä kaksi riviä pitkäkkojen puihin tapaisia tylpyskärkisiä hylmyjä; takuummin 2.-6. jokkeissa (♀) takareunan edessä rivi vahvoja hylmyjä sekä selkä- että ratsahilvissä; 3.-5. jokkeissa isot sivutapit (♀, ylit. 3 paria), joiden tavat kärjet ovat kirkasta steenpäänsä taipuneet; viimeisessä joksessa iso 2-hadrainen kärkitisäke (♀, nyphkypistimen tupea puoliskoja varten?)



Kotelokoppea juuphä ja haamas mosaiikkikoppea, jonka seinät rakennettu ohuesta riipimästä ja yhteenkittäytyneistä hiikkaruuista, kärkinipukkaan sisällä viimeksi kehättynä kellanvalkoista riipimää, joka muodostaa kerroksen nipukkaa laajemmalle alalle.

21/-60  
Hämeenlinna  
*Oxybelus uniglamus*  
Sorakuopan törmästä